

# OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, s účinností od 1. 1. 2007.

Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinné.

Věk dítěte	Pravidelné očkování	Očkovací látka
4. den až 6. týden	tuberkulóza	BCG vaccine SSI
od 13. týdne 1. dávka	záškrť, tetanus, dáivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
za měsíc po 1. dávce 2. dávka	záškrť, tetanus, dáivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
za měsíc po 2. dávce 3. dávka	záškrť, tetanus, dáivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
3.–4. měsíc po primovakcinaci	tuberkulóza – přešetření místa vpichu a regionálních uzlin	
za 6 měsíců po 3. dávce 4. dávka (nejpozději do 18 měsíců věku)	záškrť, tetanus, dáivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B	Infanrix Hexa
od 15. měsíce 1. dávka	spalničky, příušnice a zarděnky	Trivivac
21.–25. měsíc, event. později přeočkování	spalničky, příušnice a zarděnky	Trivivac
od dovršení 5. do dovršení 6. roku přeočkování	záškrť, tetanus a dáivý kašel	Infanrix
od dovršení 10. do dovršení 11. roku 5. dávka – přeočkování	přenosná dětská obrna	Imovax Polio
od dovršení 11. do dovršení 12. roku	Tuberkulóza – tuberkulinový test (Mantoux), přeočkování pouze při negativním tuberkulinovém testu	BCG vaccine SSI
od dovršení 12. do dovršení 13. roku	virová hepatitida B – pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců)	Engerix B paed.
od dovršení 14. do dovršení 15. roku	tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech	Alteana